

OVERZICHT INFECTIEZIEKTEN VOOR SCHOLEN EN KINDERCENTRA

Ziekte en voorkeursleeftijd:	Kun je herkennen aan:	Is besmettelijk in de periode:	Hoe wordt het overgedragen en hoe voorkom je verspreiding:	Maatregelen voor zwangere vrouwen:	Wering van school/ kinderdagverblijf nodig:	Contact GGD nodig:*
Bof Alle leeftijden	Koorts, opgezwollen pijnlijke wang(en), oorpijn	5 dagen vóór tot 9 dagen na de zwelling van de wang(en)	Hoesten en niezen > Alert zijn op hoest- en handhygiëne en de vaccinatiestatus van de kinderen	Geen	Niet zinvol, besmetting heeft mogelijk al plaats gevonden	Overleg is raadzaam
Diarree Alle leeftijden	Meer dan driemaal daags waterdunne ontlasting	Tijdens de klachten	Ontlasting > Zeer alert zijn op goede hand- en toilethygiëne	Geen	Mogen naar school of kindercentra. Wel strikte hygiëne handhaven	Melden als meer dan 1/3 van de groep binnen een week klachten heeft
Hand- voet- en mondziekte 1 – 5 jaar	Pijnlijke blaasjes in de mond, op de handpalmen en voetzolen	3 tot 7 dagen voor het ontstaan van de klachten tot nog tijdelijk na herstel	Hoesten, niezen, contact met het vocht uit de blaasjes en via ontlasting > Alert zijn op hoest-, hand- en toilethygiëne en het schoonhouden van speelgoed	Geen	Niet zinvol, besmetting heeft mogelijk al plaats gevonden	Melden als er binnen 2 weken 2 of meer zieken zijn in dezelfde groep
Hepatitis A Alle leeftijden	Verloopt vaak onopgemerkt bij kinderen. Koorts, buikklachten, misselijkheid, geelzucht, donkere urine, vermoeidheid	Ongeveer 1 week vóór tot ongeveer 1 week na het ontstaan van de geelzucht of koorts	Ontlasting > Goed op toilet- en verschoonhygiëne letten. Handhygiëne na toiletgang is erg belangrijk	Geen	Schoolkinderen weren tot 1 week na het ontstaan van de geelzucht. Overige kinderen niet zinvol, behalve als een kind terug komt van vakantie en nog niet op het verblijf is geweest	Melden bij de GGD als iemand verschijnselen van hepatitis A heeft
Kinkhoest Alle leeftijden	Begint met verkoudheid, droge hoest. Later flinke hoestbuien. Hoestklachten houden lang aan	4 weken vanaf de eerste klachten	Hoesten en niezen > Alert zijn op hoest- en handhygiëne en de vaccinatiestatus van kinderen < 1 jaar	Overleg met GGD of huisarts als >36 weken zwanger en er contact is geweest met iemand met kinkhoest	Niet zinvol, besmetting heeft mogelijk al plaats gevonden	Overleg is raadzaam
Krentenbaard (impetigo) <3 jaar	Bultjes die vaak beginnen in het gezicht. De bultjes worden blaasjes, gevuld met vocht	Voor en tijdens het ontstaan van de blaasjes. Niet meer besmettelijk 48 uur na beginnen antibiotica of als de blaasjes zijn ingedroogd	Hoesten, niezen en contact met het vocht uit de blaasjes > Alert zijn op hoest- en handhygiëne en het schoonhouden van speelgoed	Contact rondom de bevalling vermijden met iemand met krentenbaard	Mogen naar school of kindercentra. Wel blaasjes eventueel afplakken of starten met antibiotica (ouders adviseren naar de huisarts te gaan)	Melden als er binnen 2 weken 2 of meer zieken zijn in dezelfde groep

* Bij onrust en vragen is contact met de GGD altijd raadzaam

Ziekte en voorkeursleeftijd:	Kun je herkennen aan:	Is besmettelijk in de periode:	Hoe wordt het overgedragen en hoe voorkom je verspreiding:	Maatregelen voor zwangere vrouwen:	Wering van school/kinderdagverblijf nodig:	Contact GGD nodig:*
Mazelen ½ – 10 jaar	Hoge koorts, verkoudheid, rode ogen, rode vlekjes beginnend achter oor en vervolgens over hele lichaam	4 dagen voor het ontstaan van de klachten tot 4 dagen na het begin van de vlekjes	Hoesten en niezen > Alert zijn op hoest- en handhygiëne en de vaccinatiestatus van de kinderen	Indien niet gevaccineerd of het niet doorgemaakt: contact met mazelen patiënten vermijden	Niet zinvol, besmetting heeft zeer waarschijnlijk al plaats gevonden	Melden bij de GGD indien iemand verschijnselen van mazelen heeft
Rode hond (rubella) 5 – 20 jaar	Verkoudheid, rode vlekjes beginnend in het gezicht en vervolgens over hele lichaam, kan egaal rood/ roze worden	10 dagen vóór tot 7 dagen na het ontstaan van de rode vlekjes	Hoesten en niezen > Alert zijn op hoest- en handhygiëne en de vaccinatiestatus van de kinderen	Indien niet gevaccineerd of het niet doorgemaakt: contact met rode hond patiënten vermijden	Niet zinvol, besmetting heeft mogelijk al plaats gevonden	Melden als er binnen 2 weken 2 of meer zieken zijn in dezelfde groep
Roodvonk <6 jaar	Koorts, felrode vlekjes die eruit zien als kippenvel en voelen als schuurpapier, 'frambozentong', later vervelling van de huid	Al voor het ontstaan van de vlekjes, tot de vervelling voorbij is. Bij behandeling tot 48 uur na starten hiervan	Hoesten en niezen > Alert zijn op hoest- en handhygiëne	Contact rondom de bevaling vermijden met iemand met roodvonk	Niet zinvol, besmetting heeft mogelijk al plaats gevonden	Melden als er binnen 2 weken 2 of meer zieken zijn in dezelfde groep
Schurft (scabiës) Alle leeftijden	Toenemende jeuk, vooral 's nachts. Op de huid mogelijk rode bultjes en blaasjes	Als de mijten aanwezig zijn. 24 uur na behandeling niet meer besmettelijk	Minimaal 15 minuten of regelmatig intensief lichamelijk contact of via besmette lakens	Geen	Niet zinvol, besmetting heeft mogelijk al plaats gevonden	Melden als er binnen 2 weken 3 of meer zieken zijn in dezelfde groep
Vijfde ziekte 4 – 10 jaar	Vlindervormige vlekjes beginnend in het gezicht, vuurrode wangen. Vervolgens verspreiding over het hele lichaam. Mogelijk met koorts, jeuk	1 week voordat de vlekjes ontstaan. Bij het ontstaan van de vlekjes is er géén gevaar meer op besmetting	Hoesten en niezen > Alert zijn op hoest- en handhygiëne	Contact met huisarts of GGD opnemen als een zwangere <20 weken zwanger is en de ziekte nooit heeft gehad of dit onbekend is	Niet zinvol, besmetting heeft mogelijk al plaats gevonden	Melden als er binnen 2 weken 2 of meer zieken zijn in dezelfde groep
Waterpokken 2 – 6 jaar	Kleine rode bultjes waarop later blaasjes ontstaan met veel jeuk	2 dagen vóór tot max. 7 dagen na ontstaan blaasjes. Als de blaasjes zijn ingedroogd is het niet meer besmettelijk	Hoesten, niezen en contact met het vocht uit de blaasjes > Alert zijn op hoest- en handhygiëne en het schoonhouden van speelgoed	Indien de ziekte niet doorgemaakt: contact met besmette personen vermijden. Bij wel contact: GGD of huisarts raadplegen	Niet zinvol, besmetting heeft zeer waarschijnlijk al plaats gevonden	Melden als er binnen 2 weken 2 of meer zieken zijn in dezelfde groep
Zesde ziekte ½ – 3 jaar	Koorts, gevolgd door een niet jeukende huiduitslag beginnend in het gezicht, daarna romp, armen, nek	Tijdens de koorts en huiduitslag totdat dit verdwenen is	Hoesten en niezen > Alert zijn op hoest- en handhygiëne	Geen	Niet zinvol, besmetting heeft mogelijk al plaats gevonden	Melden als er binnen 2 weken 2 of meer zieken zijn in dezelfde groep

* Bij onrust en vragen is contact met de GGD altijd raadzaam

Meer informatie vindt u in het draaiboek gezondheidsrisico's voor basisscholen of kindercentra op de website van het RIVM: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/L/LCI_Draaiboeken
De afdeling Infectieziektebestrijding van de GGD is bereikbaar op 088 - 443 33 55 of infectieziekten@ggdnog.nl